

CAPRELSA® vandétanib

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en cancérologie**.

Le prescripteur doit discuter des risques du traitement par CAPRELSA® avec le patient. Le patient recevra la Carte d'Alerte pour le Patient avec chaque prescription.

Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Ne jetez pas les boîtes entamées emballages ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîtes de 30 comprimés pelliculés dosés à 100 mg (1 400€) ou 300 mg (4 200€)



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C** à l'abri de l'humidité.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de **300 mg en une prise par jour**.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



Les comprimés de CAPRELSA® sont à avaler **entiers avec un grand verre d'eau non gazeuse**, au cours ou en dehors des repas, **à la même heure si possible**.

Si vous ne pouvez pas avaler le comprimé, vous pouvez le disperser dans un demi-verre d'eau non gazeuse, remuez avec une cuillère et buvez sans attendre. Votre pharmacien ou votre médecin peut vous conseiller.



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.



Le pamplemousse (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par CAPRELSA®.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES




Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis (*Hypericum perforatum*)** sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Palpitations, maux de tête, vertiges, troubles visuels, bourdonnements d'oreilles	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses sanguines pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...) et de votre tension	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.
Diarrhées	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Crampes et douleurs musculaires	Buvez régulièrement (eau salée) Surveillance par analyses des sels minéraux.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.
Nausées et vomissements, changement du goût	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
Perte d'appétit	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Fatigue et insomnie	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sagement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Œdèmes	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.
Sécheresse, éruption cutanée, démangeaisons	Préférez un savon doux sans alcool ni parfum et une crème hydratante. Protection solaire.	Informez votre médecin traitant, des traitements médicaux peuvent vous soulager. Assurez-vous que vous avez un rendez-vous avec votre dermatologue au plus tard dans les 4 semaines.
 Si vous ressentez des effets non mentionnés , n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien. Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.		

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons...)
- Modification de la vision, changement de la cornée, confusion, vertiges, maux de tête, troubles de la concentration
- Difficultés à uriner, douleur intense à la vessie ou présence de sang dans les urines
- Difficultés à respirer : douleur thoracique, toux, essoufflement



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 heures, prenez la dose.

En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.

REMARQUES :

Remerciements : - Groupe VOCC B PL : Observatoire dédié au cancer BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, Conseils de l'Ordre B PL, Directions Régionales du Service Médical B PL, OMEDIT B PL, Cancéropôle Grand Ouest, Comité de patients et URPS B PL

- CH Cholet, CHU Brest, ICO René Gauducheau et au centre E Marquis Rennes
- OMÉDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand