

# TAGRISSO® osimertinib

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou compétent en cancérologie**.



Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières**.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement,** veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Deux présentations sont disponibles sous la forme de :



boîte de 30 comprimés pelliculés  
dosés à 40 mg



boîte de 30 comprimés pelliculés  
dosés à 80 mg



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **80 mg/j** en 1 seule prise

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Le comprimé de TAGRISSO® est à avaler avec un *verre d'eau en une prise par jour ou cours ou en dehors d'un repas. Essayez de le prendre chaque jour à la même heure.*

Si vous avez des difficultés à avaler, vous pouvez mélanger le médicament avec 50 ml d'eau plate. Remuez jusqu'à ce que le comprimé se soit dispersé en très petites particules. Buvez le liquide, puis rincez le verre avec de nouveau 50 ml d'eau plate et buvez-le.



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Modification du bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	Prenez votre température en cas de doute. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenez votre médecin. Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Diarrhées</b>	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
<b>Rougeur de la peau, acné, démangeaisons, assèchement...</b>	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection solaire écran total. Possibilité d'une prévention par antibiothérapie.	En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.
<b>Inflammation et rougeur du pourtour des ongles</b>	Evitez de vous ronger les ongles. Limitez le contact avec de l'eau. Evitez ou limitez les produits de manucures. Evitez les travaux manuels sans port de gants protecteurs.	Effectuez une toilette soignée des ongles par un lavage des mains à l'eau et au savon, en insistant sur le pourtour des ongles et en évitant de frotter trop fort. Veillez à bien sécher le pourtour des ongles. En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.
<b>Inflammation de la bouche</b>	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
<b>Difficulté à respirer, toux</b>	Limitez si possible les contacts avec des personnes ayant une infection contagieuse	Contactez le médecin si ces signes surviennent.
<b>Douleurs extrémités Symptômes cardiaques</b>	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...).	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

### QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- difficultés à respirer, toux, fièvre.
- Palpitations.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 heures, prenez la dose.

En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.



Il est **déconseillé de prendre TAGRISSO® pendant la grossesse et l'allaitement**. Vous devez utiliser une méthode efficace de contraception pendant la durée du traitement, jusqu'à 2 mois après la fin du traitement pour les femmes et 4 mois pour les hommes.

### REMARQUES :