

Liste des produits pharmaceutiques disponibles au livret thérapeutique du CH de Saumur

Abri de la lumière
Au réfrigérateur

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture /Remarques
ANTIBIO-SYNALAR SOL AURIC FL 10ML	Durée de traitement < 25°C Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
AURICULARUM PD US AURIC FL 15ML	8 jours entre + 2°C et + 8°C	< 25°C
BECOTIDE 250µg SUSP INH FL 200DOSES	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 30°C
BETADINE 10% BAIN BOUCHE UNIDOSE 10ML	Utilisation immédiate	Sans précautions particulières de conservation
BRICANYL TURBUHALER 500µg/DOSE FL 100D	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 25°C Abri de l'humidité
BUDESONIDE 1MG/2ML SUSP INH NEB DOSE	Utilisation immédiate	< 30°C Abri de la lumière
CERULYSE SOL US AURIC FL 10ML	1 flacon = 1 patient = 1 mois < 25°C	< 25°C
CHLORHEXIDINE CHLOROBUTANOL SDZ SOL US BUCA FL 90ML	14 jours < 25°C	< 25°C
FLIXOTIDE 50µg/DOSE SUSP INH FL 120ML	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 30°C
FORADIL 12µg PD INH GELULE	1 inhalateur = 1 patient = durée du traitement	< 25°C Abri de l'humidité
HEXASPRAY COLLUTOIRE FL 30G	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 25°C	< 25°C
IPRATROPIUM MYLAN AD 0.5MG/2ML SOL INH NEB DOSE	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 25°C
IPRATROPIUM MYLAN ENF 0.25MG/1ML SOL INH NEB DOSE	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 25°C
LIDOCAINE AGUETTANT 5% SOL NEB FL 20ML CAN LONGUE	Date de péremption du flacon	Sans précautions particulières de conservation

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture /Remarques
NASONEX 50µG SUSP US NASAL FL 120 DOSES	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 25°C	< 25°C
NATISPRAY FAIBLE 0.15MG/DOSE FL 13ML	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
NATISPRAY FORT 0.3 MG/DOSE FL 18 ML	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
OFLOCET 1.5MG SOL US AURIC DOSE 0.5ML	Utilisation immédiate	Abri de la lumière
OTIPAX 16G/30ML SOL INSTIL AURIC	1 Mois < 30°C	< 30°C
OTOFA SOL US AURIC FL 10ML	7 jours	Sans précautions particulières de conservation
PENTACARINAT 300MG PD US PARENT/AERO	24 heures entre + 2°C et + 8°C	< 30°C
PULMICORT TURBUHALER 200 MCG/DOSE FL 200	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 25°C	< 25°C
SERETIDE DISKUS 250/50µG PD INH DOSE	1 dispositif = 1 patient = durée du traitement < 30°C	< 30°C
SERETIDE DISKUS 500/50µG PD INH DOSE	1 dispositif = 1 patient = durée du traitement < 30°C	< 30°C
SOLUTE NAACL 0,9% UNIDOSE NASALE 5ML	Utilisation immédiate	Sans précautions particulières de conservation
SPIRIVA GELULE PD INH + INHALATEUR	9 jours après ouverture plaquette	< 25°C
TERBUTALINE 5MG/2ML SOL INH NEB DOSE	6 mois après ouverture du sachet	< 25°C
VENTOLINE 100µG SUSP INH FL 200 DOSES	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 30°C	< 30°C
VENTOLINE 1,25MG/2,5ML SOL INH NEB DOSE	Utilisation immédiate	< 30°C Abri de la lumière
VENTOLINE 2,5MG/2,5ML SOL INH NEB DOSE	Utilisation immédiate	< 30°C Abri de la lumière
VENTOLINE 5MG/2,5ML SOL INH NEB DOSE	Utilisation immédiate	< 30°C Abri de la lumière
XYLOCAINE 5% NAPHAZOLINE FL 24 ML SOL	28 Jours < 25°C	< 25°C