

# IMATINIB (Glivec® et génériques)

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est à prescription initiale hospitalière et renouvelé par votre **médecin spécialiste en cancérologie, en hématologie, en hépato-gastroentérologie, en médecine interne et en oncologie médicale** (site ANSM 18/03/2015).

Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.**

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîtes de 30 ou de 60 comprimés pelliculés de couleur jaune très foncé à brun orangé dosés respectivement à 400 mg et 100mg (2 096.14€ HT et 1 048.07€ HT).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C** à l'abri de l'humidité. **Gardez-le hors de portée et de la vue des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. L'administration se fait en **une ou deux prises par jour**.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les comprimés de **GLIVEC®** sont à avaler **entiers** avec un **grand verre d'eau**, au cours d'un **repas, en position assise** pour réduire le risque d'irritations gastro-intestinales.

Si vous ne pouvez pas avaler le comprimé, vous pouvez le disperser dans un grand verre d'eau ou de jus de pomme, remuez avec une cuillère puis buvez sans attendre. Votre pharmacien ou médecin peut vous aider.

Les comprimés peuvent être écrasés ou coupés.



Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par **GLIVEC®**.

## INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)




**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

| EFFETS INDESIRABLES     | PREVENTION   | CONDUITE A TENIR   |
|-------------------------|--|--|
| Nausées et vomissements | Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas. | Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses.<br>Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour). |

| EFFETS INDESIRABLES   | PREVENTION  | CONDUITE A TENIR  |
|---|---|---|
| <b>Diarrhée</b>   | Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.  | Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes.<br>Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour). |
| <b>Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires</b>   | Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. | En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.   |
| <b>Eruption cutanée</b>   | Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil.  | Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager  |
| <b>Gonflement des membres</b>   | Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Les vêtements serrés sont déconseillés<br>Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.  | Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.   |
| <b>Maux de tête, confusions, vertiges</b>   |   | Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.<br>Prudence en cas de conduite de véhicules ou de machines.  |
| <b>Crampes ou douleurs musculaires</b>  | Une hydratation régulière est recommandée.<br>Privilégiez les exercices légers.   | Contactez votre médecin en cas de persistance.  |
|  Si vous ressentez des <b>effets non mentionnés</b> , n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien. |   |   |

### QUELQUES CONSEILS



Contactez votre médecin immédiatement en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de **GLIVEC®**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.

REMARQUES :