

VENCLYXTO® vénétoclax

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste compétent en maladie du sang.**



Il est disponible dans les **pharmacies de ville.**



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Trois présentations sont disponibles sous la forme de boîte de *comprimés pelliculés* :

- rond biconvexe de couleur jaune clair dosé à **10 mg** 79€ TTC

- ovale biconvexe de couleur beige dosé à **50 mg** 195€ TTC

- ovale biconvexe de couleur jaune clair dosé à **100 mg** 384€ (7cp) 747€ (14) 5 490€ (112)



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C.**

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **400 mg/j** après une dose initiale puis une augmentation progressive sur 5 semaines.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les comprimés de VENCLYXTO® sont à avaler, le matin, avec un **grand verre d'eau en une prise par jour** au cours d'un repas. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**

Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour.



Les comprimés ne doivent ni être **écrasés**, ni coupés ou croqués.



Le **pamplemousse** (jus, pulpe), les **oranges amères** et la **carambole** doit être évité pendant votre traitement par VENCLYXTO®.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

| EFFETS INDESIRABLES | PREVENTION | CONDUITE A TENIR |
|-------------------------------|---|--|
| Modification du bilan sanguin | Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin. | Prenez votre température en cas de doute. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenez votre médecin. Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin. |

| EFFETS INDESIRABLES | PREVENTION | CONDUITE A TENIR |
|---|---|---|
| Diarrhée | Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. | Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants. |
| Nausées et vomissements | Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas. | Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour). |
| Fatigue | Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. | Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin. |
| Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires | Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. | En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques. |
| Constipation | Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers. | Buvez si possible 2 litres d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin. |

Des **battements cardiaques irréguliers**, des **convulsions**, des **urines foncées** peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.

 Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Fièvre ou frissons, nausées ou vomissements, confusion mentale, essoufflement, battements de cœurs irréguliers, urines troubles, fatigue inhabituelle, convulsions, douleur abdominale.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas d'oubli d'une prise de **moins de 8 heures**, prenez la dose.

En cas d'oubli d'une prise de **plus de 8 heures**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Il est déconseillé de prendre VENCLYXTO® pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme vous devez utiliser des méthodes contraceptives efficaces et si vous êtes un homme vous devez prendre les précautions nécessaires.

REMARQUES :