



QU'EST-CE QUE GLIVEC® IMATINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) et d'autres cancers du sang ; dans le traitement de certains types de cancers du tube digestif et de la peau.
- Prescription restreinte à votre médecin spécialiste en cancérologie, oncologie, hématologie, hépato/gastro-entérologie ou médecine interne. Prescription émanant d'un spécialiste hospitalier au minimum tous les 6 mois.
- Disponible en pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance.



- Comprimés pelliculés, de couleur jaune très foncé à brun orangé, dosés à 100 mg ou 400 mg :
 - 100 mg : inscription « NVR » sur une face et « SA » sur l'autre
 - 400 mg : inscription « glivec » gravée sur une face



- Conservez à température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants
- Ne sortez pas les comprimés de la boîte pour les mettre dans un pilulier
- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés
- Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?



A remplir avec l'aide
d'un professionnel de
santé**

Renseigné avec

.....
Selon l'ordonnance
du
...../...../.....

Dose par jour mg	= comprimé(s) de 100 mg
Quand ?	<input type="checkbox"/> Si posologie ≤ 600 mg/j → 1 prise/jour, àh..... <input type="checkbox"/> Si posologie = 800 mg/j → 2 prises/jour, àh..... eth.....	 comprimé(s) de 400 mg
Comment ?	Au cours d'un repas (réduit le risque d'irritations gastro-intestinales) Avalez le(s) comprimé(s) entier(s), avec de l'eau, l'un à la suite de l'autre, chaque jour au(x) même(s) moment(s) de la journée. Si vous ne pouvez pas avaler le(s) comprimé(s), dispersez-le(s) dans un grand verre d'eau plate ou de jus de pomme (50 mL de liquide pour 100 mg d'imatinib) ; remuez avec une cuillère et buvez sans attendre.		



Vous pouvez vous aider du **cahier de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez-vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



- **En cas d'oubli**, ne prenez pas la dose manquée, ni de dose double. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Pensez à le noter dans votre cahier de suivi*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose et ne doublez pas la prise suivante. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Pensez à le noter dans votre cahier de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION



Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments et plantes, dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent influencer sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.











Les femmes traitées doivent utiliser une méthode de contraception efficace (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 15 jours après son arrêt.

*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC GLIVEC® IMATINIB ?

Comme tous les médicaments, imatinib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

	Effets indésirables	Prévention
	Nausées, vomissements	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
	Diarrhée, douleurs abdominales	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (<i>féculents, carotte, banane...</i>). Evitez certains aliments (<i>café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices...</i>). Buvez plutôt entre les repas. Surveillez régulièrement votre poids.
	Eruption cutanée	Utilisez un savon doux sans parfum et un agent hydratant (<i>crème ou lait</i>). Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Evitez les expositions au soleil (<i>vêtements protecteurs, chapeau, écran solaire indice ≥ 50</i>). Alertez votre médecin en cas de troubles cutanés.
	Gonflement du visage et des membres (œdèmes)	Evitez les vêtements serrés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. En cas de gonflement des jambes, élevez les pieds en position assise et portez des bas de contention. Surveillez régulièrement votre poids.
	Œdème au niveau de l'œil	Contactez votre médecin en cas de rougeur, gonflement, démangeaisons de l'œil.
	Signes d'infections : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Si vous présentez une fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
	Maux de tête, confusions, vertiges	Privilégiez une alimentation saine et pensez à bien vous hydrater. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité modérée. Soyez prudent pour la conduite en automobile.
	Crampes ou douleurs musculaires	Maintenez une hydratation régulière. Privilégiez les exercices légers. Contactez votre médecin en cas de persistance.

Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses
- Informez votre médecin dès les 1ers signes persistants
- Respectez les mesures de prévention

Contacts utiles :

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons...)
- Saignements de nez ou anormaux (selles noires, sang dans les crachats)
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Remarques :
