

ALECENSA® alectinib

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie ou en oncologie médicale**.



Il est disponible uniquement dans les **pharmacies de ville**.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les gélules restantes dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et gélules non utilisées lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Deux présentations sont disponibles pour un dosage à 150 mg :

- **4 boîtes de 56 gélules** (4 593€ TTC) sous forme de plaquettes thermoformées.
- **1 flacon de 240 gélules** (4 911€ TTC).

Les gélules sont blanches et portent la mention « ALE » imprimée sur la coiffe à l'encre noire et la mention « 150mg » imprimée sur le corps à l'encre noire.



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose recommandée d'ALECENSA® est de 600mg (soit **4 gélules**) par voie orale **deux fois par jour**.

La dose peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



Les gélules d'ALECENSA® sont à avaler entières avec de l'eau. Elles doivent être prises **au cours d'un repas**.



Les gélules ne doivent pas être ouvertes ou dissoutes.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.




N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, fatigue, perte d'appétit, jaunisse, démangeaisons intenses, urines foncées et douleurs musculaires.	Pratiquez les bilans du foie prescrits par votre médecin.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Dans certains cas, le traitement sera interrompu et les fonctions hépatiques étroitement surveillées.
Œdèmes des membres	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.
Céphalées, fatigue, pâleur, vertiges	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	En cas de fatigue inhabituelle, prévenez votre médecin. Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Douleur articulaire et musculaire	Un bilan des créatines phosphokinases (CPK) doit être effectué. Buvez régulièrement. Evitez les gestes répétitifs et les efforts physiques importants	En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
Eruptions cutanées	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Nausées, vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Constipation	Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers.	Buvez si possible 2 litres d'eau par jour Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin
Diarrhée	Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Surveillance des sels minéraux par analyse.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
Ralentissement du rythme cardiaque, troubles de la vision, vertiges	Surveillance régulière de votre fréquence cardiaque et de votre tension.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces symptômes. Soyez prudent lors de la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.
 Si vous ressentez des effets non mentionnés , n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) : 14/09/2018		

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Essoufflements, toux, difficultés pour respirer
- Prise de poids rapide
- Selles pâles, démangeaisons intenses, douleurs musculaires, jaunisse



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre vos gélules d'ALECENSA® : la dose oubliée doit être prise immédiatement sauf s'il reste moins de 6 heures avant la prochaine dose ; dans ce cas ne pas prendre la dose oubliée et la dose suivante sera prise à l'heure normale. Ne prenez pas 2 doses à la fois. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Il est déconseillé de prendre ALECENSA® pendant la grossesse et l'allaitement. Utilisez une méthode contraceptive efficace au moins jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.



Ce médicament contient du **lactose**. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.

REMARQUES :