

FICHE D'AIDE A LA PRISE EN CHARGE DES DIARRHEES

A destination des professionnels de santé

V 20 03 2018

MÉDICAMENTS CONCERNÉS

- Anti EGFR: erlotinib, gefitinib...
- Anti VEGF: sorafenib, sunitinib, pazopanib...
- Anti HER2 : lapatinib...
- Autre : imatinib...

QUESTION A POSER AU PATIENT

Quelles sont vos habitudes alimentaires?

EVALUATION DIARRHEES

	Grade o	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5
Toxicité OMS	Au- cune	Passagère, < 2/jour	Tolérable, > 2/jour	Intolérable, requérant traitement	Déshydratation diarrhée hémoragique	
Classification CTCAE		Augmenta- tion ≤4 selles /état initial	Augmentation entre 4 et 6 selles / état initial	Augmentation > 7selles/état initial, interférence avec les activités de la vie quotidienne	Mise en jeu du pronostic vital nécessitant une prise en charge en urgence	Décès

TRAITEMENT

RÈGLES HYGIÉNODIÉTÉTIQUES

- Hydratation orale suffisante : 2L/jour (eau, thé, tisane, bouillon à température ambiante)
- Eviter café, boissons glacées, laitage, fruits et légumes crus, céréales, pain complet, alcool, cuisine grasse et/ou épicée
- Privilégier une alimentation pauvre en fibre : féculents, carotte, banane
 - Fractionner l'alimentation
- Attendre une semaine après les derniers symptômes pour réintroduire le lait (une diarrhée prolongée peut provoquer une intolérance au lactose)
- Si lopéramide non efficace à la fin du deuxième jour, alerter le spécialiste

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX

1ère intention : ralentisseur du transit

La prescription de lopéramide doit être concomitante à celle de l'ITK pour commencer le traitement dès les premiers symptômes.

Posologie : 2 gélules après la première selle liquide puis 1 gélule après chaque selle liquide, maximum 8/jour

Arrêt du lopéramide quand les selles liquides cessent pendant 12 heures consécutives

Si lopéramide inefficace à la fin du 2ème jour, alerter le spécialiste

Antisécrétoire: Racécadotril

En cas d'inefficacité, d'intolérance ou de contre-indication au lopéramide


Posologie : 1 gélule avant chaque repas maximum 7 jours

<u>Absorbant intestinal : Diosmectite</u>

En cas d'inefficacité du lopéramide

Posologie : 3 à 6 sachets/jour les 2 premiers jours puis 3 sachets/jour

ALGORITHME DECISIONNEL



*RHD : Règles hygiéno diététiques

COMPLICATIONS

Déshydratation, dénutrition

Hospitalisation si aggravation, vomissements associés pour une hydratation et correction des troubles hydro électrolytiques Si plus de trois selles par jour malgré traitement, consultation du spécialiste

SOURCES et REMERCIEMENTS

- Yolaine Gales (thèse pharmacie) Sophie Potin CHU Rennes. Amélie Wairy (thèse Pharmacie) Claude Bertrand E Marquis Rennes
- Thécitox
- Onconews
- Référentiel en oncologie Rhône Alpes Auvergne, Soins de support et nutrition, 4è édition

Remerciements : CH Cholet, CH St Brieuc, Clinique mutualiste Estuaire St Nazaire, Centre E Marquis Rennes, Centre Jean Bernard Le Mans