



QU'EST CE QUE ICLUSIG® PONATINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de leucémies
- Prescrit et renouvelé par votre médecin spécialiste en hématologie ou en oncologie
- Disponible en pharmacie de ville sur présentation de votre ordonnance



Comprimés pelliculés ; existence de 3 dosages :

- 15 mg : biconvexe et rond, blanc, avec l'inscription « A5 » sur une face
- 30 mg : biconvexe et rond, blanc, avec l'inscription « C7 » sur une face
- 45 mg : biconvexe et rond, blanc, avec l'inscription « AP4 » sur une face



- Conservez à température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants
- Ne sortez pas les comprimés du flacon pour les mettre dans un pilulier
- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés
- Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien


COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?



A remplir avec l'aide
d'un professionnel de
santé**

Renseigné avec

selon l'ordonnance
du/...../.....

Dose par jour mg	= comprimés
Quand ?h.....	UNE prise par jour à heure fixe pendant ou en dehors des repas	
Comment ?	 Avalez le(s) comprimé(s) entier(s), avec de l'eau (l'un à la suite de l'autre), chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.		

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez-vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



- **En cas d'oubli**, ne prenez pas la dose manquée, ne doublez pas la dose suivante. Continuez votre traitement habituellement. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose : prenez simplement la dose suivante comme prévu le lendemain. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION

Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments et plantes, dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent influencer sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.










Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces pendant toute la durée de votre traitement (méthode alternative ou supplémentaire aux contraceptifs hormonaux systémiques).


*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC ICLUSIG® PONATINIB?

Comme tous les médicaments, ponatinib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 <p>Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires</p>	Limitez les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Si vous présentez une fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
 <p>Effets digestifs : constipation ou diarrhée, douleurs abdominales, nausées, vomissements, perte d'appétit</p>	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2L d'eau par jour. Buvez plutôt entre les repas. Surveillez votre poids. En cas de constipation , privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits et fruits secs) et pratiquez une activité physique régulière. En cas de diarrhée , privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments (café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices...). Alertez votre médecin si vous présentez une augmentation de 4 à 6 du nombre de selles par jour. En cas de nausées/vomissements , mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits, et épicés.
 <p>Fatigue, insomnie, maux de tête, étourdissements</p>	Privilégiez une alimentation saine et hydratation suffisante. Respectez des temps de repos dans la journée mais essayez de conserver une activité même modérée. Soyez prudent pour la conduite automobile.
 <p>Éruption cutanée</p>	Utilisez un savant doux sans parfum et un agent hydratant (crème ou lait). Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Evitez les expositions au soleil, protégez-vous (vêtements protecteurs, chapeau, écran solaire indice ≥ 50).
 <p>Douleurs thoraciques, palpitations</p>	Surveillance régulière de votre cœur et de votre tension.
 <p>Douleurs articulaires et musculaires</p>	Hydratez-vous fréquemment. Prenez des temps de repos et faites des exercices légers (ex : marche). En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
 <p>Gonflement du visage et des membres (œdèmes)</p>	Evitez les vêtements serrés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. En cas de gonflement des jambes, élevez les pieds en position assise et portez des bas de contention. Surveillez régulièrement votre poids.

Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : signalement-sante.gouv.fr

 Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses
- Informez votre médecin dès les premiers signes persistants
- Respectez les mesures de prévention

Contacts utiles :

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Douleur thoracique, gonflement, rougeurs ou douleurs au niveau des bras ou jambes
- Perte ou prise de poids
- Fièvre, frissons



Remarques :