



QU'EST CE QUE LENVIMA® LENVATINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de **cancer de la thyroïde** (avancé ou métastatique).
- Prescrit et renouvelé par votre médecin spécialiste en oncologie.
- Disponible en pharmacie de ville sur présentation de votre ordonnance.






Gélules, 2 présentations existantes selon le dosage :

- 4 mg : corps et coiffe rouge orangé + mentions « € » sur la coiffe et «LENV 4mg» sur le corps
- 10 mg : corps jaune et coiffe rouge orangé + mentions « € » sur la coiffe et «LENV 10mg» sur le corps



- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et hors de la vue et de la portée des enfants
- Ne sortez pas les gélules de la boîte pour les mettre dans un pilulier
- Lavez vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules
- Ne jetez pas les boites entamées, merci de les rapporter à votre pharmacien

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

 A remplir avec l'aide d'un professionnel de santé**	Dose par jour mg = + gélules de 10mg gélules de 4mg	en 1 prise par jour à heure fixe
	Quand ?	àh.....	matin ou soir, au cours ou en dehors des repas	
Renseigné avec Selon l'ordonnance du ... / ... / ...		Avalez les gélules, - Soit entières avec de l'eau - Soit dissoutes : ① mettre les gélules dans une cuillère à soupe de liquide (eau, jus de pomme) ② attendre 10min ③ remuez pendant au moins 3min le temps de dissoudre l'enveloppe des gélules ④ buvez. ⑤ Après avoir bu, ajoutez la même quantité de liquide, remuez et avalez Dans tous les cas, ne pas ouvrir, ni mâcher, ni couper, ni écraser les gélules. 		

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises : N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?

- **En cas d'oubli de moins de 12h**, prenez immédiatement la dose oubliée et continuez votre traitement habituellement.
- **En cas d'oubli de plus de 12h**, ne prenez pas la dose manquée, ni de de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié. Prenez simplement la dose suivante comme prévu le lendemain. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose. Prenez simplement la dose suivante comme prévu le lendemain. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION

Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.











Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces pendant toute la durée du traitement et au moins 1 mois après son arrêt. Si vous utilisez une contraception hormonale, ajouter une contraception mécanique (préservatif, cape cervicale)

*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC LENVIMA® LENVATINIB ?

Comme tous les médicaments, lenvatinib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun

	Effets indésirables	Prévention
	Diarrhées, douleurs abdominales	Pensez à boire régulièrement : au moins 2 litres d'eau par jour ; Favorisez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...) ; Evitez certains aliments pouvant augmenter le transit intestinal (café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, gras, épices...).
	Nausées, vomissements, perte d'appétit	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
	Fatigue	Favorisez une alimentation saine et hydratation suffisante. Respectez des temps de repos dans la journée mais essayez de conserver une activité même modérée (marche). Soyez prudent pour la conduite automobile.
	Trouble cutané : picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Utilisez un nettoyant doux sans savon et un agent hydratant. Evitez l'eau chaude. Evitez les expositions au soleil, protégez-vous si vous devez le faire (vêtements, protection solaire écran total...). Ne portez pas de vêtements trop serrés. Evitez si possible les travaux irritants pour les mains, les pansements adhésifs, la station debout et la marche prolongées. Une consultation chez un pédicure-podologue peut être utile.
	Saignements inhabituels	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. Certains médicaments sont à éviter (exemple : aspirine, anti-inflammatoire non stéroïdiens comme l'ibuprofène...). Si vous présentez des saignements importants, contactez votre médecin.
	Maux de tête, douleur articulaire et musculaire	Reposez-vous souvent. Faites des exercices légers, évitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants. En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour une mise en place d'un traitement symptomatique.
	Symptômes cardiaques : Tension élevée Battements cardiaques irréguliers	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium, ...) et de votre tension (automesure à domicile). Limitez votre consommation de sel et d'alcool. Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.
	<i>Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également poser une question auprès de votre centre régional de pharmacovigilance ou déclarer tout effet indésirable sur le site : signalement-sante.gouv.fr</i>	



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses.
- Respectez les mesures de prévention.

Contacts utiles :

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Maux de tête intenses, vertiges, convulsions, confusion, difficultés pour parler, modifications de la vision
- Douleur ou oppression thoracique, douleurs dans le bras, essoufflement, battements irréguliers du cœur
- Douleur intense dans le ventre
- Selles noires, foncées ou sanglantes, toux sanglante
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Remarques :
