



QU'EST-CE QUE LORVIQUA® LORLATINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de cancers pulmonaires
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en cancérologie
- Disponible en pharmacie de ville sur présentation de votre ordonnance



- Comprimés dosés à 25 mg ou 100 mg
- 25 mg : rond, rose clair, avec les inscriptions « Pfizer » d'un côté et « 25 » et « LLN » de l'autre
- 100 mg : ovale, rose foncé, avec les inscriptions « Pfizer » d'un côté et « LLN 100 » de l'autre



- Conservez à température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants



- Ne sortez pas les comprimés du flacon pour les mettre dans un pilulier



- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés

- Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?




A remplir avec l'aide
d'un professionnel de
santé**

Renseigné avec

.....

.....

...../...../.....

Dose par jour mg	= comprimé(s) dosé(s) à mg
Quand ?h.....	UNE prise par jour pendant ou en dehors des repas	
Comment ?		Avalez le(s) comprimé(s) entier(s), avec de l'eau (l'un à la suite de l'autre), chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.	

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez-vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



- **En cas d'oubli**, la dose oubliée peut être prise jusqu'à 4 heures avant la dose suivante ; prenez immédiatement la dose oubliée et continuez votre traitement habituellement.



- **En cas d'oubli** de moins de 4 heures avant la prise suivante, ne prenez pas la dose manquée, ne doublez pas la dose suivante.

- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose : prenez simplement la dose suivante comme prévu le lendemain. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION

Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments et plantes, dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent influencer sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.













Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement, jusqu'à **35 jours** après la dernière prise pour les femmes et jusqu'à **14 semaines** après la dernière prise pour les hommes.

*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC LORVIQUA® LORLATINIB ?

Comme tous les médicaments, lorlatinib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 Nausées, vomissements, perte d'appétit	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
 Diarrhée	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 litres d'eau par jour. Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments (café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, gras, épices...).
 Constipation	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 litres d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits et fruits secs).
 Augmentation du taux de cholestérol et des triglycérides	Evitez de manger des acides gras saturés (ex : fromage, beurre, crème fraîche, viandes grasses). Pratiquez une activité physique adaptée.
 Maux de tête	En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
 Troubles visuels	Consultez rapidement votre médecin si vous présentez une baisse de la vision, une vision trouble ou une perte de la vue.
 Gonflement du visage et des membres (œdèmes)	Evitez les vêtements serrés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. En cas de gonflement des jambes, élevez les pieds en position assise et portez des bas de contention. Surveillez régulièrement votre poids.
 Fatigue, troubles de l'humeur	Privilégiez une alimentation saine et une hydratation suffisante. Respectez des temps de repos dans la journée mais essayez de conserver une activité même modérée. Soyez prudent pour la conduite automobile.
 Douleurs musculaires, articulaires	Prenez des temps de repos et faites des exercices légers (ex : marche). En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.

 Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : signalement-sante.gouv.fr



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses.
- Respectez les mesures de prévention.

Contactez rapidement votre médecin en cas :

- d'éruption cutanée
- de confusions, de difficultés à parler
- de difficultés à respirer
- de prise de poids rapide
- de tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Remarques :
