

DCI/ Spécialités	Forme et correspondances gtte, ml et mg	Posologie d'entretien (mg/jour)	Posologie maximale	Nombre de prises par jour	Populations particulières	
<b>Amisulpride</b> (Solian®)	- Solution buvable : 100 mg = 1 ml - Cp : 100-200-400 mg	Episodes psychotiques aigues	400-800 mg	<b>1200 mg/j</b>	1/jour si dose ≤ 400 mg 2/jour si dose > 400 mg	IR: - Clcr 30 - 60 ml/min : ½ dose - Clcr 10-30 ml/min : 1/3 dose
	- Solution injectable : 200 mg/4ml	Episodes négatifs prédominants	50-300 mg	<b>400 mg/j</b>		
<b>Aripiprazole</b> (Abilify®)	- Solution buvable : 1 mg = 1 ml - Cp : 5-10-15 mg	Voie orale	15 mg	<b>30 mg/j</b>	1	- Sujets âgés : dose initiale plus faible à envisager - Administration concomitante d'inhibiteurs ou inducteurs puissants du CYP3A4 ou du CYP2D6
	Solution injectable IM : 7,5 mg/ml soit 9,75 mg d'aripiprazole/flacon	Injection intramusculaire	5,25-15 mg	<b>30 mg/j</b> <b>Max 3 injections /j</b>	1-3	
<b>Clozapine</b> (Leponex®)	Cp : 25-100mg	Schizophrénie résistante au traitement	200-450 mg	<b>900 mg/j</b>	1-2 La posologie journalière totale peut être répartie de manière inégale, la dose la plus importante devant être administrée au coucher	Sujet âgés ≥ 60 ans : instauration du traitement à une dose faible (une prise de 12,5 mg le premier jour), chaque palier d'augmentation posologique ultérieur étant limité à 25 mg/jour
		Troubles psychotiques au cours de la maladie de Parkinson	50-100 mg	<b>100 mg/j</b>		
<b>Olanzapine</b> (Zyprexa®)	Cp : 5-7,5-10-15-20mg (non sécables)	Voie orale	5-20 mg	<b>20mg/j</b>	1	- Sujet âgés ≥ 65 ans, IR, IH : dose initiale 5mg à envisager - Administration concomitante inhibiteurs CYP1A2
	Solution injectable IM : 10mg/flacon	Injection intramusculaire	5-10 mg	<b>20mg/j</b> <b>3 injections/jour pendant 3 jours consécutifs</b>	1-3	
<b>Quétiapine</b> (Xeroquel®)	Cp : 50-300-400 mg	Schizophrénie/épisodes maniaques	400-800 mg	<b>800 mg/j</b>	1/j Très sédatif, à prendre le soir à distance des repas	IH et Sujets âgés : dose initiale de 50 mg/jour et augmentation par palier de 50 mg
		Episodes dépressifs majeurs dans les troubles bipolaires	300-600 mg	<b>600 mg/j</b>		
		Prévention des récurrences dans les troubles bipolaires	300-800 mg	<b>800 mg/j</b>		
		En association dans les troubles dépressifs majeurs	150-300 mg	<b>300 mg/j</b>		
<b>Risperidone</b> (Risperdal®)	- Solution buvable : 1 mg = 1 ml - Cp : 0,5-1-2-3-4 mg	Schizophrénie	4-6 mg	<b>16mg/j</b>	1	- Sujets âgés : posologie d'entretien 1-2 mg 2x/jour -IR et IH : posologies initiale et d'entretien doivent être divisées par deux, et l'augmentation posologique des doses doit être plus lente - Association aux inhibiteurs puissant du CYP2D6
		Episodes maniaques associés aux troubles bipolaires	1-6 mg	-	1	
		Agressivité chez patient Alzheimer	0,5- 1 mg max 6 semaines	-	2	