

Liste des produits pharmaceutiques disponibles au livret thérapeutique du CH de Saumur

Abri de la lumière  
Au réfrigérateur

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture /Remarques
A CERUMEN DOSE 2ML	24 heures	Entre +10°C et + 40°C
ANTIBIO-SYNALAR SOL AURIC FL 10ML	7 jours < 25°C Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
AURICULARUM PD US AURIC FL 15ML	8 jours entre + 2°C et + 8°C	< 25°C
BECOTIDE 250µG SUSP INH FL 200 DOSES	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 30°C
BETADINE 10% BAIN BOUCHE UNIDOSE 10ML	Utilisation immédiate	Sans précautions particulières de conservation
BRICANYL TURBUHALER 500µg/DOSE FL 100D	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 25°C Abri de l'humidité
BUDESONIDE 1MG/2ML SUSP INH NEB DOSE	Après 1ère ouverture du sachet : 3 mois Abri de la lumière Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 25°C Abri de la lumière
ELUDRIL BAIN BOUCHE FL 90 ML	14 jours Abri de la lumière	< 25°C
FLIXOTIDE 50µG/DOSE SUSP INH FL 120ML	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 30°C
HEXASPRAY COLLUTOIRE FL 30G	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 25°C	< 25°C
IPRATROPIUM MYL 0,5MG/2ML AD SOL INH NEB DOSE	Après ouverture du sachet : 1 mois Abri de la lumière Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 25°C Abri de la lumière

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture /Remarques
IPRATROPIUM MYL 0,25MG/1ML ENF SOL INH NEB DOSE	Après ouverture du sachet : 1 mois Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
	Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	
LIDOCAINE AGUETTANT 5% SOL NEB FL 20ML CAN LONGUE	Date de péremption du flacon	Sans précautions particulières de conservation
MIFLONIL 200µG/DOSE	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 30°C	< 30°C Abri de l'humidité
NASONEX 50µG SUSP US NASAL FL 120 DOSES	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 25°C	< 25°C
NATISPRAY FAIBLE 0,15MG/DOSE FL 13ML	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
NATISPRAY FORT 0.3 MG/DOSE FL 18 ML	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
OFLOCET 1,5MG SOL US AURIC DOSE 0.5ML	Après ouverture du sachet : Abri de la lumière	Abri de la lumière
	Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	
ONBREZ BREEZHALER 150µG INH GEL	1 dispositif = 1 patient = durée du traitement Sortir la gélule qu'au moment de l'utilisation	< 30°C Abri de l'humidité
OTIPAX 16G/30ML SOL INSTIL AURIC	1 mois < 30°C	< 30°C
OTOFA SOL US AURIC FL 10ML	7 jours	Sans précautions particulières de conservation
PENTACARINAT 300MG PD US PARENT/AERO	24 heures entre + 2°C et + 8°C	< 30°C
SALBUTAMOL MYL 5MG /2,5ML SOL INH NEB DOSE	Après ouverture du sachet : 1 mois Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
	Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	
SALBUTAMOL MYL 2,5MG /2,5ML SOL INH NEB DOSE	Après ouverture du sachet : 1 mois Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
	Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture /Remarques
SERETIDE DISKUS 250/50µG PD INH DOSE	1 dispositif = 1 patient = durée du traitement < 30°C	< 30°C
SERETIDE DISKUS 500/50µG PD INH DOSE	1 dispositif = 1 patient = durée du traitement < 30°C	< 30°C
SOLUTE NAACL 0,9% UNIDOSE NASALE 5ML	Utilisation immédiate	Sans précautions particulières de conservation
SPIRIVA GELULE PD INH + INHALATEUR	Après 1ère ouverture plaquette : 9 jours	< 25°C
SYMBICORT TURBUHALER 400/12µG FL 60 DOSES	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 30°C
TERBUTALINE MYL 5MG/2ML SOL INH NEB DOSE	Après 1ère ouverture du sachet : 1 mois Abri de la lumière Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 25°C Abri de la lumière
VENTOLINE 100µG SUSP INH FL 200 DOSES	1 flacon = 1 patient = durée du traitement < 30°C	< 30°C
VENTOLINE 1,25MG/2,5ML SOL INH NEB DOSE	Après ouverture du sachet : Abri de la lumière Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 30°C Abri de la lumière
XYLOCAINE 5% NAPHAZOLINE FL 24 ML SOL	Date de péremption du flacon < 25°C	< 25°C