

Liste des produits pharmaceutiques disponibles au livret thérapeutique du CH de Saumur

Abri de la lumière

Au réfrigérateur

(\*) Du point de vue microbiologique, le produit doit être utilisé immédiatement. En cas d'utilisation non immédiate, les durées et conditions de conservation après reconstitution et avant utilisation relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
ACICLOVIR MYLAN 250MG PD US PARENT IV	< 25°C	12 heures, < 25°C (*)
ACICLOVIR MYLAN 500MG PD US PARENT IV	< 25°C	12 heures, < 25°C (*)
ACIDE ZOLEDRONIQUE MEDAC 4MG/100ML SOL INJ	< 25°C Ne pas congeler	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
ACTILYSE 50MG PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C 8 heures, < 25°C
ACTOSOLV UROKINASE 100 000UI PD US PARENT	entre +2 et +8°C	12 heures, < 20°C (*)
ADRENALINE 1MG/1ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
ADRENALINE 5MG/5ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
AETOXISCLEROL 3% 60MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
ALBUNORM 20% SOL INJ FL 100ML	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
ALPROSTADIL INT 0,5MG/ML INJ AMP 1ML	entre +2 et +8°C	24 heures
AMIKACINE MYLAN 250MG PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	10 jours, entre +2 et +8°C 24 heures, < 25°C
AMIKACINE MYLAN 500MG PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	10 jours, entre +2 et +8°C 24 heures, < 25°C

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
AMOXICILLINE Pan 1g PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
AMOXI A CLAVU PAN 1G/200MG PD US PARENT	< 30°C	Utilisation immédiate 15 min maximum entre la reconstitution et la fin d'administration IV 60 min maximum entre la dilution et la fin de la perfusion
AMOXI-A CLAVU PAN 500MG/50MG PD US PARENT	< 30°C	Utilisation immédiate 15 min maximum entre la reconstitution et la fin d'administration IV 60 min maximum entre la dilution et la fin de la perfusion
ANAFRANIL 25MG/2ML SOL INJ	Aabri de la lumière	Utilisation immédiate
ARANESP 10MCG/0,4ML SOL INJ SER	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Aabri de la lumière	7 jours, < 25°C Aabri de la lumière
ARANESP 20MCG/0,5ML INJ SER SEC	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Aabri de la lumière	7 jours, < 25°C Aabri de la lumière
ARANESP 50MCG/0,5ML INJ SER SEC	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Aabri de la lumière	7 jours, < 25°C Aabri de la lumière
ARANESP 60MCG/0,3ML INJ SER SEC	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Aabri de la lumière	7 jours, < 25°C Aabri de la lumière
ARANESP 130MCG/0,65ML INJ SER SEC	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Aabri de la lumière	7 jours, < 25°C Aabri de la lumière
ARIXTRA 2,5MG/0,5ML SOL INJ SER	< 25°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
ARIXTRA 7,5MG/0,6ML SOL INJ SER	< 25°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
ASPEGIC 1G PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
ASPEGIC 500MG PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
ATRACURIUM HPI 50MG/5ML SOL INJ	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Aabri de la lumière	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
ATROPINE RENAUDIN 0.25MG/1ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
ATROPINE RENAUDIN 0.50MG/1ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
AZANTAC 50MG/2ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate Pas besoin de protéger de la lumière le flacon pendant la perfusion
BACTRIM 400MG/80MG SOL INJ AMP 5ML	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
BEVITINE 100MG/2ML SOL INJ AMP 2ML	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
BICARBONATE SODIUM 1.4% SOL INJ AMP 10ML	< 25°C	Utilisation immédiate
BICARBONATE SODIUM 4.2% SOL INJ AMP 10ML	< 25°C	Utilisation immédiate
BLEU METHYLENE PROVEBLUE 5MG/ML SOL INJ	Ne pas réfrigérer Ne pas congeler Abri de la lumière	Utilisation immédiate
BLEU PATENTE V GUERBET AMP 2 ML SOL INJ	< 30°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
BREVIBLOC 100MG/10ML SOL INJ FL 10ML	< 25°C Ne pas congeler	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
BRIDION 100MG/ML SOL INJ FL 2ML	< 30°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*) Abri de la lumière
BUPIVACAINE RACHIANESTHESIE 20MG/4ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
CAFEINE CITRATE 25MG/ML SOL INJ BUV 2ML	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
CALCIPARINE SC 5000UI SOL INJ SER 0.2ML	< 30°C	Utilisation immédiate
CALCIPARINE SC 7500UI SOL INJ SER 0.3ML	< 30°C	Utilisation immédiate
CALCIPARINE SC 25000UI SOL INJ AMP 1ML	< 30°C	Utilisation immédiate
CALCIUM CHLORURE 10% AMP VERRE 10ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
CALCIUM GLUCONATE PROAMP 10% 10ML SOL INJ	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
CARBOCAINE 2% SOL INJ FL 20ML	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
CATAPRESSAN 0.15MG/1ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
CEFAZOLINE 2G PD US PARENT IV	Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
CEFOTAXIME PANPHARMA 1G PD US PARENT IV IM	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
CEFOTAXIME PANPHARMA 500MG PD US PARENT IV IM	Abri de la lumière	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
CEFOXITINE 2G PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
CEFTAZIDIME ARROW 1G PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
		8 heures, < 25°C (*)
CEFTRIAXONE MYLAN 0,5G PD US PARENT	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
		8 heures, < 25°C (*)
CEFTRIAXONE MYLAN 1G PD US PARENT	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
		8 heures, < 25°C (*)
CEFUROXIME MYLAN IV/IM 750MG PD US PARENT	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
		6 heures, < 25°C (*)
CELESTENE 4MG/1ML SOL INJ	< 30°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
CELESTENE CHRONODOSE 1ML SUSP INJ	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
CELOCURINE 100MG/2ML SOL INJ	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
CERNEVIT PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
CIPROFLOXACINE KABI POCHE 200MG/100ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, < 25°C si concentration entre 0,4 mg/ml à 1mg/ml (*)
CIPROFLOXACINE KABI POCHE 400MG/200ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, < 25°C si concentration entre 0,4 mg/ml à 1mg/ml (*)
CLAMOXYL 0.5G PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	Après reconstitution : (*) 6 heures, après dissolution dans du sérum physiologique 1 heures au maximum après dissolution dans une solution glucosée
CLINDAMYCINE KABI 600MG/4ML SOL INJ	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
CLOPIXOL AP 200MG/ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
CLOPIXOL ASP 50MG/ML SOL INJ IM	15-25°C	Utilisation immédiate
CLOTTAFAC 1,5G/100ML PD US PARENT	< 25°C Ne pas congeler Abri de la lumière	6 heures, < 25°C
CONTRAMAL 100MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
CORDARONE 150MG/3ML SOL INJ IV	< 25°C	Utilisation immédiate
CUROSURF 120MG/1,5ML SUSP	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
DANTRIUM FL 20 MG PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
DEBRIDAT 50MG/5ML SOL INJ	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
DEPAKINE 400MG/4ML PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
DEXAMETHASONE 20MG/5ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
DIAMOX 500MG PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
DIGOXINE AD 0.5MG/2ML SOL INJ IV	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
DOBUTAMINE PAN 250MG/20ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
DOPAMINE MYLAN 200MG/5ML SOL INJ PERF	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
DROPERIDOL AGT 1,25MG/1ML SOL INJ IV	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
EAU PPI AGUETTANT PROAMP 10ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
EAU PPI AGUETTANT PROAMP 20ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
ENANTONE LP 3.75MG PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	Après reconstitution : 24 heures, 25°C (*)
EPHEDRINE AGT 30MG/10ML AMP PP SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
ERYTHROCINE 0.5G PD US PARENT IV	Sans précautions particulières de conservation	Solution initiale (dans eau PPI) : 24 heures, 25 °C OU solution initiale (dans eau PPI) : 15 jours, entre +2 et +8°C Solution finale : 12 heures, 25 °C
ERYTHROCINE 1G PD US PARENT IV	Sans précautions particulières de conservation	Solution initiale (dans eau PPI) : 24 heures, 25 °C OU solution initiale (dans eau PPI) : 15 jours, entre +2 et +8°C Solution finale : 12 heures, 25 °C
EXACYL 500MG/5 ML SOL INJ IV	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
ESOMEPRAZOLE SUN 40MG PDR INJ FL	< 30°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
EUPRESSYL 25MG/5ML SOL INJ AMP	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
FABRAZYME 35MG PD US PARENT	entre +2 et +8°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
FER MYLAN 100MG/5ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	12 heures, entre 12-25°C après dilution dans NaCl 0,9% (*)
FERINJECT 50MG/ML SOL INJ FL 10ML	< 30°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
FLEBOGAMMA DIF 50MG/ML INJ FL 50ML	< 30°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
FLEBOGAMMA DIF 50MG/ML INJ FL 100ML	< 30°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
FLEBOGAMMA DIF 50MG/ML INJ FL 200ML	< 30°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
FLEBOGAMMA DIF 50MG/ML INJ FL 400ML	< 30°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
FLUANXOL LP 20MG/ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
FLUCONAZOLE KABI 100MG/50ML POCHE SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
FLUMAZENIL MYLAN 0.50MG/5ML SOL INJ	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
FLUMAZENIL MYLAN 1MG/10ML SOL INJ	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
FLUORESCEINE 10% 0.5G/5ML SOL INJ	Ne pas réfrigérer	Utilisation immédiate
FOMEPIZOLE AP-HP 5MG/ML INJ AMP 20ML	Sans précautions particulières de conservation	< 24 heures (*)
FUNGIZONE FL 50 MG PD US PARENT	entre +2 et +8°C	Solution concentrée : 24 heures, entre +2 et +8°C (*)
	Abri de la lumière	Solution pour perfusion : Utilisation immédiate
FUROSEMIDE 250MG/25ML SOL INJ IV	Abri de la lumière	Utilisation immédiate Après ouverture / dilution : 24h entre la préparation et la fin d'administration si abri de la lumière
GARDENAL 40MG/2ML PDR ET SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GARDENAL 200MG/4ML PDR ET SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GADOVIST SER PRE REMPLIE 15ML	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GADOVIST SER PRE REMPLIE 7,5ML	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GAMMANORM 165MG/ML INJ FL 12ML	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
	Abri de la lumière	
GAMMANORM 165MG/ML INJ FL 24ML	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
	Abri de la lumière	
GAMMANORM 165MG/ML INJ FL 48ML	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
	Abri de la lumière	

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
GARDENAL 40MG PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GENTAMICINE 10MG/1ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GENTAMICINE 40MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GENTAMICINE 80MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GENTAMICINE 160MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
GLUCAGEN 1MG/1ML PD US PARENT	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	Utilisation immédiate
GLUCOSE 30% PROAMP 10ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
GLUCOSE 5% PROAMP 10ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
GLUCOSE 5% PROAMP 20ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
GLUCOSE AGUETTANT 10% PROAMP 10ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
HALDOL 5MG/1ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
HALDOL DECANOAS 50MG/1ML SOL INJ IM	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
HEPARINE CHOAY 5000UI/1ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
HEPARINE SODIQUE PAN 25000UI/5ML SOL INJ	Ne pas congeler	Utilisation immédiate
HIDONAC 5MG/25ML SOL INJ	Abri de la lumière	24 heures, < 25°C
HYDROCORTISONE 100MG PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
HYDROCORTISONE 500MG PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
HYDROXYSINE RENAUDIN 100MG/2ML SOL INJ	Abri de la lumière	24 heures, entre le début de la préparation et fin d'administration
HYPNOMIDATE 20MG/10ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
IG SPEC ANTI-D RHOPHYLAC 200µG/2ML SER INJ	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	Utilisation immédiate
IG SPEC HEPATITE B SOL INJ SER 1 ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	Utilisation immédiate
IG SPEC HEPATITE B SOL INJ SER 5ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
IG SPEC TETANOS SOL INJ SER 2 ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	Utilisation immédiate
IMIPENEM CILASTATINE ARROW IV 500MG/20ML PD US PARENT	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C 24 heures, < 25°C 2 heures, entre le début de la préparation et fin d'administration
INSULINE ABASAGLAR 100 UI/ml	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	28 jours, < 30°C Abri de la lumière
INSULINE HUMALOG 100UI/ML FL 10ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	28 jours, < 30°C 28 jours, entre +2 et +8°C
INSULINE HUMALOG 100UI/ML KWIKPEN	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	28 jours, < 30°C
INSULINE LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	4 semaines, < 25°C Abri de la lumière
INSULINE NOVOMIX 30 FLEXPEN 100U/ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	4 semaines, <30°C Abri de la lumière
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	4 semaines, <30°C Abri de la lumière
INSULINE TOUJEO 300 UI/ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	6 semaines, <30°C Abri de la lumière
INSULINE UMULINE NPH KWIKPEN 100UI/ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	28 jours, < 30°C
INSULINE UMULINE PROFIL 30 KWIKPEN 100UI/ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	28 jours, < 30°C
INTEGRILIN 20MG/10ML SOL INJ	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
INTEGRILIN 75MG/100ML SOL PERF	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
ISOPTINE 5MG/2ML SOL INJ IV	Abri de la lumière	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
ISOSORBIDE D MED 10MG/10ML INJ AMP	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
ISUPREL 0.2MG/1ML SOL INJ	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
	3 mois, < 25°C Abri de la lumière	
IVHEBEX 5000UI/100ML PDR ET SOL INJ	entre +2 et +8°C	24 heures < 25°C (*)
	Ne pas congeler Abri de la lumière	
KANOKAD 250UI/10ML PD US PARENT	entre +2 et +8°C	3 heures, entre 15-25°C
	Ne pas congeler Abri de la lumière	
KANOKAD 500UI/20ML PD US PARENT	entre +2 et +8°C	3 heures, entre 15-25°C
	Ne pas congeler Abri de la lumière	
KARNODYL 5MG/5ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
	Abri de la lumière	
KCL LAV 10% AMP PP 10ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
KCL LAV 15% AMP VERRE 10ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
KCL LAV 20% AMP VERRE 10ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
LARGACTIL 25MG/5ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
LAROXYL 50MG/2ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
LASILIX 20MG/2ML SOL INJ AMP	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
LEPTICUR 10MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
LEVETIRACETAM AGT 500MG/5ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
LIDOCAINE 200MG/20ML AGUETTANT SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
LIDOCAINE 400MG/20ML AGUETTANT SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
LIDOCAINE ADR AGT 10MG/ML INJ 10ML	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
LIDOCAINE ADR AGT 20MG/ML INJ 10ML	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
LOVENOX 0.2ML SOL INJ SC	< 25°C	Utilisation immédiate
LOVENOX 0.4ML SOL INJ SC	< 25°C	Utilisation immédiate
LOVENOX 0.6ML SOL INJ SC	< 25°C	Utilisation immédiate
LOVENOX 0.8ML SOL INJ SC	< 25°C	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
LOVENOX 1.0ML SOL INJ SC	< 25°C	Utilisation immédiate
LOXAPAC 50MG/2ML SOL INJ IM	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
MAGINJECTABLE 0,8% SOL INJ AMP 10ML	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
MAGNESIUM SULFATE 15% PROAMP 10ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
METALYSE 10 000U PD SOL INJ	< 30°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
METHERGIN 0.2MG/1ML SOL INJ	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
METHYLPREDNISOLONE MYLAN IV 500MG/10ML PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
METHYLPREDNISOLONE MYLAN IV/IM 20MG/3ML PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
METHYLPREDNISOLONE MYLAN IV/IM 40MG/3ML PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
METHYLPREDNISOLONE MYLAN IV/IM 120MG/3ML PD US PARENT	< 25°C	Utilisation immédiate
METOCLOPRAMIDE CHL REN 10MG/2ML INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate 24 heures, entre le début de la préparation et fin d'administration
METRONIDAZOLE POCHE 500MG/100ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
MIDAZOLAM 5MG/5ML SOL INJ IV IM RECTALE	Sans précautions particulières de conservation	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
MIDAZOLAM ACC 5MG/ML INJ AMP 10ML	Sans précautions particulières de conservation	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
MINIRIN AMP 4 MCG/1 ML SOL INJ	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
NACL AGT 10% PROAMP 10ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
NACL AGT 20% AMP PE 10ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
NACL AGT 20% AMP PE 20ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
NACL LAV 0.9% AMP PP 10ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
NACL LAV 0.9% AMP PP 20ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
NACL LAV 0.9% AMP PP 5ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
NALADOR AMP 500 MCG PD US PARENT	entre +2 et +8°C	12 heures, entre +2 et +8°C
NALBUPHINE MYLAN 20MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
NALOXONE 0.4MG/1ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
NEFOPAM MYLAN 20MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
NEORECORMON 30000UI/0,6ML INJ SER	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
NEUPOGEN 48MU/0,5ML SOL INJ SER	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
NICARDIPINE 10MG/10ML SOL INJ	< 25°C	48 heures < 25°C (*)
NITRONAL 5MG/5ML SOL INJ	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
NORADRENALINE 8MG/4ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, < 25°C (*)
NOVOSEVEN 2MG PD US PARENT	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*) A l'abri de la lumière
NOVOSEVEN 5MG PD US PARENT	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*) Abri de la lumière
OCTREOTIDE HOSPIRA 100µG/1ML SOL INJ	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	24 heures, < 25°C (*) Abri de la lumière
OFLOXACINE MYLAN 200MG/40ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
ONDANSETRON 4MG/2ML SOL INJ AMP VERRE	< 25°C Abri de la lumière	7 jours, entre +2 et +8°C (*)
ONDANSETRON 8MG/4ML AMP VERRE SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	7 jours, entre +2 et +8°C (*)
ORBENINE 1G PD US PARENT IV	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
ORGARAN 750UAXA/0.6ML SOL INJ	< 30°C Ne pas congeler Abri de la lumière	12 heures < 25°C (*)
OXYTOCINE MSO 5UI/1ML INJ AMP 1ML	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
PAMIDRONATE SODIUM 15MG/5ML SOL INJ	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
PAMIDRONATE SODIUM 90MG/10ML SOL INJ	< 25°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
PARACETAMOL ADULTE 1000MG/100ML SOL INJ	< 25°C	Suremballage ouvert < 24h (*)
PARACETAMOL NOUR ENF 500MG/50ML SOL INJ	< 25°C	Suremballage ouvert < 24h (*)
PEDIAVEN AP-HP NOUVEAU NE 1 POCHE 250ML SOL PERF	< 25°C Ne pas congeler Dans suremballage	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
PEDIAVEN AP-HP NOUVEAU-NE 2 POCHE 250ML SOL PERF	< 25°C Ne pas congeler Dans suremballage	Utilisation immédiate
PENICILLINE G 1 000 000 PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
PENICILLINE G 5 000 000 PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
PHENERGAN AMP 50 MG/2 ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
PHENYLEPHRINE 500µG/10ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
PHOCYTAN 6,6% PROAMP 10ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	24 heures < 25°C (*)
PIPERACILLINE TAZ KBI 4G/0,5G 50ML	< 25°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
POLARAMINE 5MG/1ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
PRO-DILANTIN 750MG/10ML SOL INJ	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
PROFENID 100MG PD US PARENT PERF	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
PROGESTERONE RETARD 500MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
PROLASTIN-C 1G/20ML INJ FL+FL 20ML	< 25°C Abri de la lumière	3 heures
PROPOFOL FRESENIUS 200MG/20ML EMULS INJ	< 25°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
PROSTIGMINE AMP 0.5 MG/1 ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
PROTAMINE CHOAY 1000U/ML SOL INJ FL 10ML	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
PYRIDOXINE RENAUDIN 250MG/5ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate 24 heures, entre le début de la préparation et fin d'administration Abri de la lumière
QUINIMAX 500MG/4ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
RADIOSELECTAN URINAIRE 30% PERF FL 250ML	< 30°C Abri des rayons X Abri de la lumière	Utilisation immédiate
RIFADINE 600MG PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
RIMIFON 500MG/5ML SOL INJ	< 25°C	Utilisation immédiate
RISPERDALCONSTA LP 50MG/2ML PD US PARENT	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	6 heures, < 25°C Abri de la lumière

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
RIVOTRIL AMP 1 MG/1 ML SOL INJ	Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
		12 heures, < 25°C (*)
ROCURONIUM HPI 10MG/ML SOL INJ 5ML	entre +2 et +8°C	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
		72 heures, < 30°C (*)
ROPIVACAINE KBI 2MG/ML INJ AMP 20ML	Ne pas congeler	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
ROPIVACAINE KBI 7.5MG/ML INJ AMP 20ML	Ne pas congeler	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
ROVAMYCINE 1 500 000 UI PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	12 heures (*)
SALBUTAMOL RENAUDIN 5MG/5ML SOL PERF IV	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
SCOPOLAMINE 0.5MG/2ML SOL INJ	< 30°C	Utilisation immédiate
		24 heures, entre le début de la préparation et fin d'administration
SEROPRAM 20MG/0.5ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	6 heures, < 25°C
SOLUDACTONE 100MG PD US PARENT IV	< 25°C Abri de l'humidité	Utilisation immédiate
SOLUDACTONE 200MG PD US PARENT IV	< 25°C Abri de l'humidité	Utilisation immédiate
SPASFON AMP 40 MG/4 ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
STRIADYNE 20MG/2ML SOL INJ	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
SUPPLIVEN SOL INJ AMP 10ML	Sans précautions particulières de conservation	24 heures, entre +2 et +8°C (*)
		24 heures, < 25°C (*)
SYNACTHENE IMMEDIAT 0.25MG/1ML SOL INJ	entre +2 et +8°C	Utilisation immédiate
	Abri de la lumière	
TANGANIL 500 MG SOL INJ IV	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
TEGELINE 10G/200ML PD US PARENT	< 25°C	24 heures, < 25°C
	Ne pas congeler Abri de la lumière	
TEGELINE 2.5G/50ML PD US PARENT	< 25°C	24 heures, < 25°C
	Ne pas congeler Abri de la lumière	
TEGELINE 5G/100ML PD US PARENT	< 25°C	24 heures, < 25°C
	Ne pas congeler Abri de la lumière	
TENORMINE AMP 5 MG/10 ML SOL INJ IV	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
TERCIAN 50MG/5ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
THIOPENTAL INRESA 0,5G PD US PARENT	Sans précautions particulières de conservation	24 heures, entre +2 et +8°C (*) 9 heures, < 25°C (*)
THYROGEN 0,9MG PDR INJ	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	24 heures, entre +2 et +8°C (*) Abri de la lumière Injection dans les 3 heures après reconstitution
TIAPRIDAL 100MG/2ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
TILDIEM 25MG PD US PARENT IV	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
TILDIEM 100MG PD US PARENT IV	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
TRACTOCILE 37.5MG/5ML SOL PERF	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
TRACTOCILE 6,75MG/0,9ML SOL INJ	entre +2 et +8°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
TRANDATE 100MG/20ML SOL INJ	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
TRANXENE 20MG/2.0ML PD US PARENT	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
TUBERTEST 5UI/1ML FL 10 DOSES	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	28 jours, entre +2 et +8°C
ULTRAVIST 370 SOL INJ FL 100ML	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
ULTRAVIST 370 SOL INJ FL 50ML	Abri de la lumière	Utilisation immédiate
VACCIN BOOSTRIX TETRA SUSP INJ SER 0,5ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	Utilisation immédiate
VACCIN ENGERIX B IM 10µG/ 0,5MLSUSP INJ	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
VACCIN ENGERIX B IM 20µG/1ML SUSP INJ	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
VACCIN PRIORIX SOL INJ SC	entre +2 et +8°C Ne pas congeler Abri de la lumière	8 heures, entre +2 et +8°C
VACCIN REVAXIS SUSP INJ IM SC	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate
VACCIN TETRAVAC ACELLULAIRE SUSP INJ IM	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	Utilisation immédiate

Produit	Conservation avant ouverture	Conservation après ouverture (Dilution, reconstitution)
VALIUM 10MG/2ML SOL INJ	< 30°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
VALPROATE NA AGT 400MG/4ML INJ IV	Sans précautions particulières de conservation	24 heures
VANCOMYCINE MYLAN 250MG PD US PARENT	< 25°C	72 heures, entre +2 et +8°C
VANCOMYCINE MYLAN 500MG PD US PARENT	< 30°C	24 heures, à 4°C
VICTOZA 6MG/ML STYLO 3ML	entre +2 et +8°C Ne pas congeler	28 jours, entre +2 et +8°C
	Abri de la lumière	28 jours, < 30°C
VISIPAQUE 320MG/20ML SOL INJ	< 30°C Abri de la lumière Abri des rayons ionisants	Utilisation immédiate
VITAMINE B12 DELAGRANGE 1000µG/2ML SOL INJ	< 25°C Abri de la lumière	Utilisation immédiate
XYLOCARD 50MG/ML SOL INJ PERF FL 20ML	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate
XYLOCARD INTRAVEINEUX 100MG/5ML SOL INJ	Sans précautions particulières de conservation	Utilisation immédiate