

Liste des produits pharmaceutiques disponibles au livret thérapeutique du CH de Saumur

Abri de la lumière  
Au réfrigérateur

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture / Remarques
ATROPINE SULFATE 0.3% COLLYRE FL 10ML	15 jours	Pas de précautions particulières de conservation
AZYTER 15MG COLLYRE UNIDOSE	Utilisation immédiate Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
BETADINE 5% SOL OCUL DOSE 20ML	Utilisation immédiate	< 25°C
CELLUVISC 4MG COLLYRE UNIDOSE	Utilisation immédiate Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
CILOXAN 0,3% COLLYRE FL 5ML	15 jours	Pas de précautions particulières de conservation
COSOPT 2% COLLYRE FL 5ML	28 jours Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
CROMEDIL 2% COLLYRE UNIDOSE 0.3ML	Utilisation immédiate	< 25°C
DACRYOSERUM LOTION OCCULAIRE DOSE 5ML	Utilisation immédiate	Pas de précautions particulières de conservation
DEXAFREE 1MG/ML COLLYRE UNIDOSE 0.4ML	Après 1ère ouverture du sachet : 5 Jours Abri de la lumière Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	Abri de la lumière
DORZOLAMIDE 2% EG COLLYRE FL 5ML	28 jours Abri de la lumière	< 30°C Abri de la lumière
FLUORESCEINE FAURE 0.5% COLLYRE DOSE 0.4ML	Utilisation immédiate	Pas de précautions particulières de conservation
GANFORT 0.3MG+5MG/ML COLLYRE UNIDOSES	Après 1ère ouverture du sachet : 10 Jours Abri de la lumière Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	Abri de la lumière
INDOCOLLYRE 0.1% COLLYRE UNIDOSES	Utilisation immédiate < 25°C	< 25°C
IOPIDINE 1% COLLYRE UNIDOSE 0.4ML	Utilisation immédiate	< 25°C Dans emballage extérieur

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture / Remarques
ISOPTO-PILOCARPINE 2% COLLYRE FL 10ML	15 jours	Pas de précautions particulières de conservation
MIOCHOLE 20MG PD SOL OCULAIRE	Après reconstitution : utilisation immédiate	< 25°C
MONOPROST 50µG/ML COLLYRE UNIDOSE 0.2ML	Après 1ère ouverture du sachet : 7 Jours Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 25°C
MYDRIASERT 0.28MG/5.4MG INSERT OPH	Utilisation immédiate	< 25°C
MYDRIATICUM 2MG/0.4ML COLLYRE UNIDOSE	Utilisation immédiate	< 25°C
NEOSYNEPHRINE FAURE 5% COLLYRE FL 5ML	15 jours	Pas de précautions particulières de conservation
OPHTIM 0.25 % COLLYRE 0.625MG/0.25ML UNIDOSE 0.25ML	Après 1ère ouverture du sachet : 30 Jours Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 25°C
OPHTIM 0.5 % COLLYRE 1.25MG/0.25ML UNIDOSE 0.25ML	Après 1ère ouverture du sachet : 30 Jours Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 25°C
OXYBUPROCAINE 1.6MG/0.4ML COLLYRE UNIDOSE	Utilisation immédiate	Pas de précautions particulières de conservation
QUINOFREE 1.5MG/0.5ML COLLYRE UNIDOSE	Après 1ère ouverture du sachet : Abri de la lumière Après ouverture d'un récipient unidose: utilisation immédiate	< 25°C Abri de la lumière
RIFAMYCINE COLLYRE FL 10ML	15 jours Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
RIFAMYCINE POMMADE OPH TUBE 5G	15 Jours	< 25°C
SKIACOL COLLYRE DOSE 0.5ML	Utilisation immédiate	< 25°C
STER-DEX POMMADE OPH DOSE	Utilisation immédiate	< 25°C
TETRACAINE 1% COLLYRE UNID 0,4ML	Utilisation immédiate	Pas de précautions particulières de conservation
TOBRADEX COLLYRE FL 5ML	1 mois < 25°C	< 25°C
TOBEX 0,3% COLLYRE FL 5ML	15 jours < 25°C	< 25°C

Produit	Conservation après ouverture	Condition de conservation avant ouverture / Remarques
UNIFLUID UNIDOSE 0,4ML COLLYRE	Utilisation immédiate	< 25°C
VITAMINE A FAURE COLLYRE FL 10ML	15 Jours < 25°C Abri de la lumière	entre + 2°C et + 8°C Abri de la lumière
VITAMINE A POMMADE OPH TUBE 10G	28 jours < 25°C	< 25°C
ZOVIRAX 3% POMMADE OPH TUBE 4.5G	1 mois	< 25°C Abri de la chaleur Si exposition chaleur : vérifier aspect