


# Prise en charge des Infections urinaires

## Evaluation des Pratiques Professionnelles dans les établissements de santé des Pays de la Loire


### LA POPULATION

- 37 ES participants
- 993 dossiers inclus


Nombre d'établissements et de patients par département




### Sex ratio




### Box-plot de l'âge des patients



### Box-plot de la clairance à la créatinine



### Facteurs de risque



### SIGNES CLINIQUES

SYNDROMES FONCTIONNELS URINAIRES	54,4%
FIEVRE	47,5%
DOULEUR EBRANLEMENT LOMBAIRE	12,6%
PROSTATE DOULOUREUSE	10,7%
HYPOTHERMIE	3,4%

### AIDE AU DIAGNOSTIC

- ➔ BU REALISEE DANS **64 %**
- ➔ ECBU PRATIQUE DANS **89,7 %**

### DIAGNOSTIC


INFECTION URINAIRE MASCULINE	26,2%
INFECTION URINAIRE SANS PRECISION	16,2%
NON MENTIONNE	11,8%
CYSTITE AIGUË SIMPLE	10,1%
PNA A RISQUE DE COMPLICATION	10,2%
PYELONEPHRITE AIGUË SIMPLE	9,6%
CYSTITE A RISQUE DE COMPLICATION	7,6%
SEPSIS D'ORIGINE URINAIRE	4,5%
PYELONEPHRITE AIGUË GRAVE	3,8%

## L'ANTIBIOTHERAPIE (ATB)

### ➤ ATB PROBABILISTE

- **70,9% des patients** ont eu une ATB probabiliste.
- **7.8%** (55) des patients ont eu une bithérapie.
- Durée médiane : **5 jours** [Q1 = 3; Q3;7]

### Antibiotique probabiliste prescrit en fonction de l'indication



### ➤ ATB DOCUMENTEE

- Durée médiane : **8,5 jours** [Q1 = 6; Q3;14]

	Nombre	Pourcentage
PAS D'ATB PROBABILISTE	212	21.3
CHANGEMENT	287	<b>28.9</b>
ARRET	284	<b>28.6</b>
POURSUITE	133	13.4
<i>Dont changement de voie</i>	28	2.8
NON APPLICABLE	66	6.6
PROBABILISTE Non Renseignée	11	1.1


PERTINENCE DECLAREE DE LA MISE EN PLACE DE L' ATB : **72,5 %**

### ➤ DUREE TOTALE DE L'ANTIBIOTHERAPIE

- Durée médiane : **10 jours**
- Q1 = 7
- Q3 = 14

PERTINENCE DECLAREE DE LA DUREE RECOMMANDEE : **48,1 %**

### Antibiotique prescrit après documentation en fonction de l'indication



PERTINENCE DECLAREE DE L'ANTIBIOTIQUE RECOMMANDE : **63 %**