

FICHE PRATIQUE – COVID-19 VACCIN SPIKEVAX® DE MODERNA

(Vaccin à ARNm, à nucléoside modifié, codant pour la protéine S)

Présentation


Dispersion injectable sous forme de flacons multidoses de 5 mL (10 doses de 0,5 mL ou 20 doses de 0,25 mL)
Dispersion de couleur blanche à blanc cassé



Boîte de 10 flacons

Conservation


- Congélateur entre -25 et -15°C (à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine)
- Peut être conservé **9 mois**



Flacon non ouvert

- Réfrigérateur entre 2-8°C (à l'abri de la lumière)
- Jusqu'à **30 jours** (ou **24 heures maximum** à température ambiante < 25°C)
- **Ne doit pas être recongelé**

Après ouverture du flacon



Étiquette du flacon :
Date et heure de décongélation et de péremption (30 jours)

Étiquette du flacon :
Date et heure de péremption (19 heures)

Préparation

Le flacon doit être décongelé au réfrigérateur (2 – 8°C) pendant 2h30 ou à température ambiante (15 – 25°C) pendant 1 heure. Laisser le flacon atteindre la température ambiante (< 25°C). Tourner délicatement le flacon, après décongélation et avant chaque prélèvement. **Ne pas secouer.** Aucune dilution à effectuer. Utiliser une technique d'asepsie rigoureuse.

Prélever 0,5 mL ou 0,25 mL de vaccin du flacon multidose à l'aide d'une seringue de 1 mL avec une aiguille appropriée.

Ne pas regrouper le produit résiduel provenant de différents flacons.

En cas de préparation à l'avance

Étiquette de la seringue :
Nom du vaccin, n° lot, date et heure limite d'utilisation

Administration

Après avoir réalisé une asepsie de la peau au point d'injection, administrer une dose (0,5 mL ou 0,25 mL) par voie intramusculaire (IM), de préférence dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras.

Dans « vaccin COVID » et dossier patient :
Nom du vaccin, n° lot, date et heure de l'administration



Pensez à déclarer tout effet indésirable à votre CRPV

Surveillance



Anaphylaxie : Surveillance étroite du patient pendant au moins 15 minutes
(exceptions : **DGS du 05/01/21**) → Disposer d'un kit d'anaphylaxie

Élimination du matériel

Éliminer la seringue et l'aiguille dans un container DASRI adapté aux objets piquants, coupants, tranchants. Tout vaccin non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.

Schéma vaccinal initial

2 doses de **0,5 mL** espacées de **3 à 7 semaines**
(Exception immunodéprimés : **DGS du 28/01/22**)

Rappel vaccinal

- 1^{ère} dose de rappel de **0,25 mL** à partir de **3 mois** après la fin du schéma vaccinal initial.
- 2^{ème} dose de rappel de **0,25 mL**
 - à partir de **3 mois** après la 1^{ère} dose de rappel pour les personnes immunodéprimées et les **80 ans et plus**.
 - o à partir de **6 mois** après la 1^{ère} dose de rappel pour les adultes de **60 à 79 ans**.