



QU'EST CE QUE BRAFTOVI® ENCORAFFENIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de cancer colorectaux (avancés ou métastatiques).
- Prescrit et renouvelé par votre médecin spécialiste en oncologie.
- Disponible en pharmacie hospitalière sur présentation de votre ordonnance.



Gélules avec inscriptions : « A » stylisé sur le haut et « LGX dosage » sur le bas ;
Couleurs : orange et chair (gélules dosées à **50 mg**) ou chair et blanche (gélules dosées à **75 mg**).



• A conserver à température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants

• Ne sortez pas les gélules de la boîte pour les mettre dans un pilulier



• Lavez vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules





• Ne jetez pas les boites entamées, merci de les rapporter à votre pharmacien

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?



A remplir avec l'aide d'un professionnel de santé**

Renseigné le
...../...../.....
avec

Dose par jour mg	= gélules
Quand ?h.....	1 prise par jour à heure fixe au cours ou en dehors des repas	
Comment ?		Avalez les gélules entières, avec de l'eau, l'une à la suite de l'autre, chaque jour au même moment de la journée Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre. 	

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises :
N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



• **En cas d'oubli depuis moins de 12h**, prenez immédiatement la dose oubliée et continuez votre traitement habituellement. **En cas d'oubli de plus de 12h**, ne prenez pas la dose manquée ni de double dose ; la dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.



• **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose et ne doublez pas la prise suivante, la dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION



Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments, plantes dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.










Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après la dernière prise.

*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC BRAFTOVI® ENCORAFENIB ?

Comme tous les médicaments, encorafenib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 Nausées, vomissements, perte d'appétit	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
 Diarrhées, douleurs abdominales	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments (café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices...). Buvez plutôt entre les repas. Surveillez régulièrement votre poids.
 Constipation	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2L d'eau par jour ; Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits et fruits secs). Pratiquez une activité physique régulière. Surveillez régulièrement votre poids.
 Saignements inhabituels	Utilisez une brosse à dent souple pour éviter les saignements buccaux. Evitez l'utilisation d'un thermomètre rectal. Ne prenez ni aspirine, ni anti-inflammatoire (ex : ibuprofène) sans avis médical. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines. Prévenez votre médecin si vous prenez habituellement des médicaments qui modifient la coagulation du sang.
 Eruption cutanée ; sècheresse	Utilisez un nettoyant doux sans savon et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil, protégez-vous si vous devez le faire (vêtements, protection solaire écran total...). Ne portez pas de vêtements trop serrés. Evitez si possible les travaux irritants, les pansements adhésifs, la station debout et la marche prolongées. Une consultation de podologie ou chez un pédicure peut être utile avant ou pendant le traitement.
 Fatigue, insomnie	Privilégiez une alimentation saine et hydratation suffisante. Respectez des temps de repos dans la journée mais essayez de conserver une activité même modérée. Soyez prudent pour la conduite automobile.
 Douleurs articulaires et musculaires	Faites des exercices légers et buvez abondamment. Contactez votre médecin en cas de symptômes incommodants tels que crampes, douleurs ou difficultés à la marche.

Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](https://www.solidarites-sante.gouv.fr/centre-regional-de-pharmacovigilance) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : signalement-sante.gouv.fr



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses
- Respectez les mesures de prévention

Contacts utiles :

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Modification de la peau (nouvelle verrue, peau irritée ou grosseur rougeâtre ou changement de taille ou couleur d'un grain de beauté)
- Saignement inhabituels (présence de sang dans les toux avec crachats, les selles, les urines ou les vomissements), maux de tête, vertiges ou faiblesses, douleurs abdominales
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Remarques :
