



QU'EST-CE QUE VITRAKVI® LAROTRECTINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de cancer des tissus mous (sarcome)
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en cancérologie
- Disponible en pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance



Solution buvable jaune-orangée, concentrée à 20 mg/mL, en flacon de 100 mL



- Conservez au réfrigérateur, à température entre 2 et 8°C, hors de la vue et de la portée des enfants. Le flacon se conserve au maximum 30 jours après la 1^{ère} ouverture. Pensez à noter la date d'ouverture sur le flacon.



- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du flacon.



- Ne jetez pas les flacons entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?



A remplir avec l'aide
d'un professionnel de
santé**

Renseigné avec

selon l'ordonnance
du/...../.....

Dose

..... mg (=..... mL) àh..... et
..... mg (=..... mL) àh..... = mg par jour
1 mL de solution = 20 mg

**2 prises par jour, matin et soir, à heure fixe
pendant ou en dehors des repas**

Comment ?



Utilisez une seringue pour voie orale :
- seringue de 1 mL graduée tous les 0,1 mL si dose < 1 mL (< 20 mg)
- seringue de 5 mL graduée tous les 0,2 mL, si dose ≥ 1 mL (≥ 20 mg)
Remplissez la seringue jusqu'au trait de graduation correspondant à la dose prescrite en mL. Mettez la seringue dans la bouche, poussez doucement sur le piston et avalez le médicament.

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez-vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



- **En cas d'oubli**, ne prenez pas la dose manquée, ni de dose double. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose et ne doublez pas la prise suivante. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION








Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments et plantes, dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent influencer sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.



- Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement **et jusqu'à 1 mois après la dernière prise.**
- Interrompre l'allaitement durant le traitement **et jusqu'à 3 jours après la dernière prise.**

*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr

Comme tous les médicaments, Larotrectinib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

	Effets indésirables	Prévention
	Fatigue, vertiges	Privilégiez une alimentation saine et pensez à bien vous hydrater. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée. Soyez prudent pour la conduite automobile.
	Nausées, vomissements, altération du goût	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
	Constipation	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (<i>légumes verts, fruits et fruits secs</i>). Pratiquez une activité physique régulière.
	Douleurs musculaires, faiblesse musculaire	Hydratez-vous fréquemment. Prenez des temps de repos et faites des exercices légers (ex : marche). Evitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants. En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
	Fourmillements, perte de sensibilité, engourdissement, douleurs dans les pieds et les mains	Protégez-vous du froid, lavez-vous les mains à l'eau chaude, évitez de porter des chaussures trop serrées. Effectuez des massages avec une crème hydratante au niveau des mains et des pieds. Buvez et mangez à température ambiante.



Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : signalement-sante-gouv.fr



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses
- Respectez les mesures de prévention

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Vertiges, fourmillements, picotements, engourdissement
- Vomissements répétés
- Constipation persistante
- Douleurs, faiblesse musculaire
- Signes d'anémie (pâleur, fatigue anormale...)
- Signes infectieux (fièvre, frissons, toux...)
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Remarques :
