

FICHE PRATIQUE – NUVAXOVID® (NVX-CoV2373) DE NOVAVAX

(Vaccin à protéine recombinante, utilisant la protéine Spike associée à l'adjuvant Matrix-M)

Présentation

Dispersion injectable sous forme de flacons multidoses de 5 mL (10 doses de 0,5 mL)
Dispersion incolore à légèrement jaune, limpide à légèrement opalescente (pH 7,2)

Boîte de 10 flacons



Conservation


Flacon non ouvert



- Réfrigérateur entre 2-8°C (à l'abri de la lumière)
- Jusqu'à **9 mois** (ou **12 heures maximum** à température ambiante < 25°C)
- Ne pas congeler



Après ouverture du flacon



2°C - 25°C **6 heures maximum**

Étiquette du flacon :

Date et heure de péremption (6 heures)

Préparation

Sortir le flacon du réfrigérateur et le laisser atteindre la température ambiante.
Tourner délicatement le flacon multidose avant et entre chaque retrait de dose. **Ne pas secouer. Vaccin prêt à l'emploi.**
Utiliser une technique d'asepsie rigoureuse.
Prélever 0,5 mL du flacon multidose à l'aide d'une seringue de 1 mL avec une aiguille appropriée.
Ne regroupez pas les résidus de vaccin provenant de différents flacons.

En cas de préparation à l'avance

Étiquette de la seringue :

Nom du vaccin, n° lot, date et heure limite d'utilisation

Dans le dossier patient :

Nom du vaccin, n° lot, date et heure de l'administration

Administration

Après avoir réalisé une asepsie de la peau au point d'injection, administrer **une dose de 0,5 mL** par voie intramusculaire (IM), de préférence dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras.



Anaphylaxie : Surveillance étroite du patient pendant au moins 15 minutes
(exceptions : [DGS du 05/01/21](#)) → Disposer d'un kit d'anaphylaxie



Pensez à déclarer tout effet indésirable à votre [CRPV](#)

Élimination

Éliminer la seringue et l'aiguille dans un container DASRI adapté aux objets piquants, coupants, tranchants. Tout vaccin non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Schéma vaccinal initial

2 doses de **0,5 mL** espacées de **3 semaines**.

Rappel vaccinal

Pas d'AMM pour ce type d'utilisation. **La HAS estime que les données disponibles ne sont pas suffisamment robustes pour envisager l'utilisation en rappel du vaccin Nuvaxovid® chez des sujets primovaccinés avec d'autres vaccins.**