




## QU'EST CE QUE VOTUBIA® ÉVÉROLIMUS ?

- Immunosuppresseur utilisé, chez l'adulte et chez l'enfant, dans le traitement de l'angiomyolipome rénal (AR) ou de l'astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes (SEGA) associé à une sclérose tubéreuse de Bourneville (STB)
- Prescrit et renouvelé par votre médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients présentant une STB
- Disponible en pharmacie hospitalière sur présentation de votre ordonnance

Plusieurs présentations sont disponibles :

- comprimés dosés à **2,5 mg, 5 mg ou 10 mg**
- comprimés **dispersibles** dosés à **2 mg, 3 mg ou 5 mg**




- Conservez à température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants
- Ne sortez pas les comprimés de la boîte pour les mettre dans un pilulier
- Lavez vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés
- Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

## COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?



A remplir avec l'aide  
d'un professionnel de  
santé\*\*

Renseigné avec  
.....  
Selon l'ordonnance du  
...../...../.....

Dose par jour	..... mg	=	..... comprimé (s)
Quand ?	.....h.....	<b>UNE prise par jour, à heure fixe, Au cours ou en dehors d'un repas, en continu</b>	
Comment ?		Avalez les comprimés en entier, avec de l'eau, l'un à la suite de l'autre. Les comprimés dispersibles peuvent être dissous dans l'eau (pendant 3 minutes). Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser les comprimés	

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi\*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.  
N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.  
\*\* Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez vous à votre ordonnance la plus récente.

## QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?



- **En cas d'oubli**, ne prenez pas la dose manquée, ni de double dose. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi\*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi\*.

## INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION



Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments et plantes, dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent influencer sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.












- Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception hautement efficaces pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 8 semaines après la dernière prise.
- Interrompre l'allaitement durant le traitement et jusqu'à 2 semaines suivant la dernière prise

\*Carnet de suivi disponible sur les sites [www.omeditbretagne.fr](http://www.omeditbretagne.fr) ou [www.omedit-paysdelaloire.fr](http://www.omedit-paysdelaloire.fr)

# QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC VOTUBIA® ÉVÉROLIMUS ?

Comme tous les médicaments, évérolimus peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 Inflammation de la bouche	Ayez une bonne hygiène bucco-dentaire ( <i>brosse à dents souple, dentifrice non mentholé non abrasif</i> ). Veillez à hydrater vos lèvres ( <i>demandez conseil à votre pharmacien, en particulier si vous êtes traité par oxygénothérapie</i> ), à entretenir la stimulation salivaire ( <i>glaçons, chewing-gums...</i> ), à pratiquer des bains de bouche au bicarbonate de sodium 4 à 6 fois/j. Favorisez une alimentation fractionnée. Privilégiez les liquides et aliments mixés. Evitez l'alcool, le café, le tabac et les aliments pouvant être irritants.
 Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Si vous présentez une fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
 Nausées, vomissements, perte d'appétit	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
 Diarrhée	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation pauvre en fibres ( <i>féculents, carotte, banane...</i> ). Evitez certains aliments ( <i>café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épicés...</i> ). Buvez plutôt entre les repas. Surveillez régulièrement votre poids.
 Eruption cutanée	Utilisez un savon doux sans parfum et un agent hydratant ( <i>crème ou lait</i> ). Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Evitez les expositions au soleil ( <i>vêtements protecteurs, chapeau, écran solaire indice ≥ 50</i> ). Alerte votre médecin en cas de troubles cutanés.
 Saignements de nez, hémorragies, ecchymoses	Saignements de nez : pendant toute la durée du saignement, penchez la tête en avant et mouchez vous jusqu'à évacuation des caillots. Exercez une légère pression sur vos narines pendant 10 min. Des produits hémostatiques peuvent être utilisés pour réduire le temps de compression (ex : mèches à appliquer après 2 à 3 min de compression et à laisser en place 30 min). Utilisez une brosse à dent souple pour éviter les saignements buccaux. Evitez l'utilisation d'un thermomètre rectal. Ne prenez ni aspirine, ni anti-inflammatoire (ex : ibuprofène) sans avis médical.
 Fatigue, céphalées, insomnie	Favorisez une alimentation saine et pensez à bien vous hydrater. Respectez des temps de repos dans la journée mais essayez de conserver une activité même modérée (marche). Soyez prudent pour la conduite automobile. En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
 Hypertension	Mesurez régulièrement votre tension (suivi à domicile ou chez le pharmacien). Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez votre consommation de sel et d'alcool.
	Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également poser une question auprès de votre <a href="#">centre régional de pharmacovigilance</a> ou déclarer tout effet indésirable sur le site : <a href="http://signalement.social-sante.gouv.fr">signalement.social-sante.gouv.fr</a>



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

## QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses
- Respectez les mesures de prévention

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Signes d'infection (fièvre, toux, frissons ...)
- Saignements, selles noires, crachats comportant du sang
- Essoufflement, sensation de vertige, étourdissement, douleur dans la poitrine
- Douleur, rougeur ou gonflement au niveau des jambes
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

---

---

Remarques :

---

---