



Infections invasives à méningocoques (IIM) A, C, W, Y

VACCINS COMMERCIALISÉS



VACCINS NON VIVANTS

Polyosidiques conjugués à l'anatoxine tétanique :

- MenQuadfi® : solution injectable (AMM à partir de 12 mois)
- Nimenrix® : poudre et solvant pour solution injectable (AMM à partir de 6 semaines)

Polyosidiques conjugués à la protéine CRM197 de *Corynebacterium diphtheriae* :

- Menveo® : poudre et solution pour solution injectable (AMM à partir de 2 ans)

Interchangeabilité des vaccins

Les trois vaccins Mn ACWY sont considérés comme interchangeables, dans le respect de leur AMM.

RECOMMANDATIONS VACCINALES

Calendrier vaccinal
de l'année en cours

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES



NOURRISSONS

- 1 dose à 6 mois (Nimenrix®) et 1 dose à 12 mois (MenQuadfi® ou Nimenrix®)**
Rattrapage : 1 dose entre 12 et 24 mois

VACCINATION OBLIGATOIRE



ADOLESCENTS

- 1 dose entre 11 et 14 ans révolus (MenQuadfi®, Menveo® ou Nimenrix®)**
Rattrapage : 1 dose entre 15 et 24 ans révolus



RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES



PERSONNES À RISQUE* et entourage familial

- De 6 semaines à 5 mois : **2 doses** de Nimenrix® (espacées d'au moins 2 mois), **1 dose à 12 mois** puis **1 rappel tous les 5 ans**
- De 6 à 12 mois : **1 dose à 6 et 12 mois** puis **1 rappel tous les 5 ans**
- A partir de 12 mois : **1 dose** puis **1 rappel tous les 5 ans**

*Personnes à risque : Personnes avec un déficit en fraction terminale du complément, un traitement anti-complément, un déficit en properdine, une asplénie anatomique ou fonctionnelle, ou ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques

Age < 11 ans

Age < 11 ans

Age ≥ 11 ans

Age ≥ 11 ans

PROFESSIONNELS

- Personnels des laboratoires de recherche travaillant spécifiquement sur le méningocoque : **1 dose**



CAS CONTACT D'IIM

- 1 dose** dans les dix jours après le dernier contact avec le cas index (Nimenrix® à partir de 6 semaines ; MenQuadfi® ou Nimenrix® à partir de 12 mois ; Menveo® ou Nimenrix® à partir de 2 ans)

Age < 11 ans

Age < 11 ans

Age ≥ 11 ans

Age ≥ 11 ans

PRECAUTIONS D'ADMINISTRATION



ADMINISTRATION CONCOMITANTE

Ces vaccins peuvent être administrés le même jour, dans des sites d'injection séparés, avec la plupart des vaccins recommandés chez les nourrissons et les adolescents (se référer au [RCP de chaque vaccin](#))

GROSSESSE / ALLAITEMENT



- Grossesse : reporter si possible la vaccination après la grossesse
- Allaitement : vaccination possible

CONSERVATION



- A conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C**, dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière
- Ne pas congeler**

DONNÉES DE STABILITÉ

- MenQuadfi® : conservation possible entre 8°C et 25°C pendant **72 heures**
- Menveo® : conservation possible entre 8°C et 25°C pendant **8 heures après reconstitution**
- Nimenrix® : conservation possible entre 0°C et 2°C ou entre 8°C et 25°C pendant **72 heures avant ouverture**, entre 8°C et 30°C pendant **8 heures après reconstitution**




A L'ISSUE DE CES PÉRIODES,
LES VACCINS DOIVENT ÊTRE
UTILISÉS OU JETÉS !



Informations non exhaustives, se référer au RCP de chaque molécule pour plus de précisions

Vaccination : Infections invasives à méningocoques (IIM) A, C, W, Y



<https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/> ; <https://professionnels.vaccination-info-service.fr/> ; <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal> ; <https://vaccineinfo.fr/> ; <https://www.ameli.fr/pharmacien/sante-prevention/vaccination>