

LES DIFFERENTS FERS INJECTABLES



2 TYPES DE FERS INJECTABLES

Les spécialités à base de fer IV ne sont **PAS EQUIVALENTES** et ne sont **PAS INTERCHANGEABLES**.

Attention au risque de **CONFUSION**

CARBOXYMALTOSE FERRIQUE



COMPLEXE D'HYDROXYDE FERRIQUE SACCHAROSE

SPÉCIALITÉS : **FERINJECT®**, CARBOXYMALTOSE FERRIQUE SANDOZ®, CARBOXYMALTOSE FERRIQUE TEVA®, CARBOXYMALTOSE FERRIQUE VIATRIS®

SPÉCIALITÉS : **VENOFER®**, FER ARROW®, FER SANDOZ®, FER VIATRIS®, FER PANPHARMA®

✓ Dose maximale par administration (adulte) = **1 000 MG**

IVD : 15 mg/kg
Perfusion IV : 20 mg/kg } Maximum 1 000 mg/semaine

✓ **7 jours minimum** entre 2 administrations à la dose maximale

✓ Dose maximale par administration (adulte) = **300 MG**

✓ **48H minimum** entre 2 administrations quelle que soit la dose

✓ Concentration minimale de **2 mg/mL**

✓ Concentration minimale de **1 mg/mL**

✓ Durée minimale de perfusion IV : **15 minutes pour 1 000 mg**

✓ Durée minimale de perfusion IV : **90 minutes pour 300 mg**



- ✓ IV directe *sans* dilution
- ✓ Perfusion IV *après* dilution*
- ✓ Dans la ligne veineuse du dialyseur *non* dilué



- ✓ Perfusion IV lente *après* dilution*
- ✓ Dans la ligne veineuse du dialyseur *après* dilution*

*Dilution dans une solution isotonique stérile de NaCl uniquement

Pour les informations concernant les indications, se référer aux RCP