

FLUORESCEINE

FLUORESCEINE FAURE®,
FLUOCYNE®
10 % ampoule 5 mL

Statut : médicament



FLUORESCEINE FAURE®
0,5 % collyre unidose 0,4 mL

Statut : médicament



INDICATION

Diagnostic en ophtalmologie :
angiographie fluoresceïnique du fond de
l'œil

Surveillance des ulcérations cornéennes
et conjonctivales, prise de tension
oculaire, recherche du phénomène du
SEIDEL, étude du sac et du film lacrymal,
adaptation et surveillance des lentilles de
contact

POSOLOGIE

1 ampoule de 5 mL

1 à 2 gouttes dans le cul-de-sac
conjonctival inférieur avant l'examen

ADMINISTRATION

INJECTION INTRAVEINEUSE

De préférence dans la **veine antécubitale**



VOIE OCULAIRE LOCALE

**NE PAS INJECTER EN INTRA-ARTERIELLE OU
INTRATHECALE**

NE PAS INJECTER

- Hypersensibilité immédiate :
surveillance au moins 30 minutes
post-examen et maintien d'un abord
veineux pendant au moins 5 minutes
- Risque d'extravasation (pH alcalin)
- Ne pas utiliser si < 18 ans
- Eviter chez la femme enceinte
- Allaitement : arrêt 7 j après injection

- Ne pas utiliser avec des lentilles
souples hydrophiles
- Risque de sensibilisation
- En cas de traitement concomitant par
un autre collyre, espacer les
instillations de 15 minutes
- Eviter chez la femme enceinte
- Allaitement : arrêt 2 j après instillation

Les informations de cette fiche ne sont pas exhaustives, se référer au RCP / notice de chaque produit pour plus de précisions

Sources : RCP / Notice ; Bien identifier les différents colorants "bleus" au bloc opératoire, OMÉDIT Centre-Val de Loire, juillet 2025 ; Risque d'hypersensibilité avec les colorants utilisés au bloc, ANSM, décembre 2025 ; Colorants tissulaires : utilisation chirurgicales et diagnostiques, Dossier du CNHIM, juin 2021 XLII 3