


VERT D'INDOCYANINE

INFRACYANINE®
poudre + solvant 25 mg/10 mL

Statut : médicament



| | ONCOLOGIE | HEPATOLOGIE | CARDIOLOGIE | OPHTALMOLOGIE |
|---|--|--|---|--|
| INDICATION | Repérage peropératoire du ganglion sentinelle et visualisation des voies lymphatiques en cas de cancer du sein | Détermination du débit sanguin ¹ et de la réserve fonctionnelle hépatique ² par tests de clairance | Mesure du volume sanguin circulant et du débit cardiaque | Etude des vaisseaux choroïdiens par angiographie oculaire en infra-rouge |
| POSOLOGIE | 5 mg dans la zone périaréolaire ou péritumorale, 10 min avant le début de la chirurgie | ¹ : perfusion continue de 0,25 mg/min/m ² ² : injection unique de 0,5 mg/kg | Adulte : 5 à 20 mg Enfant : 2,5 mg Nourrisson : 0,2 mg/kg | 0,25 à 0,5 mg/kg (0,35 mg/Kg en moyenne) |
| ADMINISTRATION | INJECTION SOUS-CUTANEE périaréolaire ou péritumorale |  INJECTION INTRAVEINEUSE | | |
| Reconstitution du flacon de 25 mg de poudre avec les 10 mL de G5 % fourni → <i>Incompatibilité avec le NaCl</i> | | | | |

- Réaction d'hypersensibilité immédiate
- Dose max adulte par voie injectable 0,5 mg/kg
- Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement

Les informations de cette fiche ne sont pas exhaustives, se référer au RCP / notice de chaque produit pour plus de précisions

Sources : RCP / Notice ; Bien identifier les différents colorants "bleus" au bloc opératoire, OMÉDIT Centre-Val de Loire, juillet 2025 ; Risque d'hypersensibilité avec les colorants utilisés au bloc, ANSM, décembre 2025 ; Colorants tissulaires : utilisation chirurgicales et diagnostiques, Dossier du CNHIM, juin 2021 XLII 3